

喙果藤一新变种

丁建南

A NEW VARIETY OF GYNOSTEMMA YIXINGENSE

Ding Jian-nan

〔提要〕 本文发表了喙果藤一新变种——毛果喙果藤 *Gynostemma yixingense* (Z. P. Wang et Q. Z. Xie) C. Y. Wu et S. K. Chen var. *trichocarpum* J. N. Ding, var. nov.。该变种与喙果藤(原变种)的主要区别是果实具毛、雌花序变化较大。

毛果喙果藤 新变种 图

Gynostemma yixingense (Z. P. Wang et Q. Z. Xie) C. Y. Wu et S. K. Chen var. *trichocarpum* J. N. Ding, var. nov.

A typo recedit floribus femineis varianioribus, racemis spiciformibus infernis medianisque 7—11 cm longis vel raro in angustipaniculas, versus apicibus sensim brevibus et fasciculatis ad apicibus; fructibus juvenibus dense albopubescentibus, infernis medianisque partibus fructuum maturorum brevipilis, in partibus superiore pilis delapsis et granis remanentibus, rostris longioribus; seminibus parvioribus et ad margines non sulcatis, acuminibus ad apicibus manifestioribus.

Anhui, Tongling, Dongdian, Tianmenshan, secus rivulum, 10 Nov. 1986, J. N. Ding 86077 (Typus, NJU)

本变种与喙果藤(原变种)的主要区别在于:雌花序变化较大,植株中、下部为穗形总状花序,稀类似狭窄圆锥形,长7—11厘米,往上渐短,植株上部之雌花序呈高度缩短之穗形总状或簇生;幼果被白色柔毛,成熟果实之中、下部具稀疏的硬毛状短柔毛,上部残留粗糙的细颗粒状毛基,顶端的喙状物稍长,裂开的角度略大;种子较小,表面之瘤饰较明显,边缘沟槽不明显,顶端之尖突较长,使种子略呈三角锥形。

产我国安徽省东南部的铜陵县,模式标本采自铜陵县董店乡天门山,生于山脚小河边灌丛中。

本文作者工作单位:江西,南昌,江西科学院 (Jiangxi Academy of Sciences, Nanchang, Jiangxi).




图 毛果腺果藤 *Gynostemma yixingense* (Z. P. Wang et Q. Z. Xie)
 C. Y. Wu et S. K. Chen var. *trichocarpum* J. N. Ding
 1. 植株中部果枝; 2. 植株上部果枝; 3. 果; 4. 种子。